13 mars 2006

Introduction à la théorie quantique des champs phénoménologique:

2. Applications de la représentation de Mellin-Barnes et des sommes harmoniques en théorie des champs.

David GREYNAT

CPT Marseille

Première partie

Représentation de Mellin-Barnes et développements asymptotiques de diagrammes de Feynman

S.Friot, D.Greynat et E.de Rafael, *Physics Letters B* **628:73-84** (2005)

S.Friot, D.Greynat et E.de Rafael, *Travail en cours*

Motivations

- ❑ Face à la complexité des calculs exacts des diagrammes de Feynman en théorie des champs perturbative, on peut espérer obtenir des simplifications en cherchant à calculer des développements asymptotiques (différentes échelles).
- ❑ L'anomalie magnétique des leptons est un très bon laboratoire à la fois théorique et expérimental pour contrôler le bien fondé de ces développements
- ❑ Utilisation des propriétés de la transformée de Mellin

Anomalie magnétique du muon

ou moment magnétique anormal du muon

anomalie

Formule de Landé: $\vec{\mu} = g \frac{e}{2m} \vec{s}$

Facteur de Landé

En théorie quantique: $g = 2$

En théorie quantique des champs: $g \neq 2 \implies g = 2(1 + a)$

Anomalie magnétique

En théorie quantique des champs, le calcul de l'anomalie fait intervenir la fonction à trois points:

$\mathbb{P} \rightarrow a$

Projecteur sur une des structures tensorielles qui permet d'isoler l'anomalie

L'ordre le plus bas: un exemple détaillé

Premier calcul perturbatif de l'histoire **Schwinger 1948**

$$\Gamma_\nu = (-ie)^2 i \bar{u}(p') \int \frac{d^{4-\epsilon}k}{(2\pi)^{4-\epsilon}} \frac{\gamma_\alpha (\not{p}' + \not{k} + m_\mu) \gamma_\nu (\not{p} + \not{k} + m_\mu) \gamma^\alpha}{[(p' + k)^2 - m_\mu^2] [(p + k)^2 - m_\mu^2] k^2} u(p)$$

Le numérateur se simplifie comme

$$\text{Num.}_\nu = [(2 - \epsilon)k^2 + 4(p + p') \cdot k + 4p \cdot p'] \gamma_\nu - 4(p + p')_\nu \not{k} - 2(2 - \epsilon)k_\nu \not{k} + 4m_\mu k_\nu .$$

Paramétrage ou « paramétrisation » de Feynman:

$$\frac{1}{abc} = 2 \int_0^1 dx x \int_0^1 dy \frac{1}{[(a - b)xy + (b - c)x + c]^3} = 2 \int_0^1 dx x \int_0^1 dy \frac{1}{D^3}$$

$$\begin{cases} a &= (p' + k)^2 - m_\mu^2 = 2p' \cdot k + k^2 \\ b &= (p + k)^2 - m_\mu^2 = 2p \cdot k + k^2 \\ c &= k^2 \end{cases}$$

$$D = [k + (xp + xyq)]^2 - \underbrace{[x^2(p + yq)^2]}_{\doteq \mathbb{R}^2} \quad q = p - p'$$

Où:
$$\mathbb{R}^2 = x^2 [m_\mu^2 + y(y-1)q^2]$$

$$\Gamma_\nu = (-ie)^2 i 2 \int_0^1 dx x \int_0^1 dy \bar{u}(p') \int \frac{d^{4-\epsilon}k}{(2\pi)^{4-\epsilon}} \times \frac{[(2-\epsilon)k^2 + 4(p+p') \cdot k + 4p \cdot p'] \gamma_\nu - 4(p+p')_\nu \not{k} - 2(2-\epsilon)k_\nu \not{k} + 4m_\mu k_\nu}{[[k + (xp + xyq)]^2 - \mathbb{R}^2]^3} u(p)$$

On effectue le changement de variable: $\tilde{k} = k + (xp + xyq)$

Avec le projecteur on sélectionne la partie qui contribue à l'anomalie:

$$a_\mu = (-ie)^2 i 2 \int_0^1 dx x \int_0^1 dy \int \frac{d^{4-\epsilon}\tilde{k}}{(2\pi)^{4-\epsilon}} \frac{2m_\mu^2 x [(2-\epsilon)x - 2]}{[\tilde{k}^2 - \mathbb{R}^2]^3}$$

On peut calculer l'intégrale sur les impulsions (intégrales hypersphériques)

$$\mu^\epsilon \int \frac{d^{4-\epsilon}\tilde{k}}{(2\pi)^{4-\epsilon}} \frac{1}{[\tilde{k}^2 - \mathbb{R}^2]^3} = -\mu^\epsilon \frac{i}{(2\sqrt{\pi})^{4-\epsilon}} \frac{\Gamma(1 + \frac{\epsilon}{2})}{\Gamma(3)} (\mathbb{R}^2)^{-1 - \frac{\epsilon}{2}} \underset{\epsilon \rightarrow 0}{=} -\frac{i}{32\pi^2 \mathbb{R}^2}$$

On obtient la représentation paramétrique de l'anomalie à l'ordre le plus bas:

$$a_\mu = (-ie)^2 i \left(-\frac{i}{32\pi^2} \right) 8 \int_0^1 dx (x-1) = \boxed{\frac{1}{2} \frac{\alpha}{\pi}}$$

❑ Comme nous venons de le voir ce genre de calcul a nécessité tout un arsenal d'outils différents, hélas, cela n'empêche pas les calculs de devenir de plus en plus complexes pour les diagrammes d'ordre plus élevé.

❑ Principale difficulté: intégrales paramétriques (I.P.) impossibles à calculer exactement.

➡ Méthode systématique de développement asymptotique des I.P.

[S.Friot, D.Greynat et E.de Rafael, *Physics Letters B* **628:73-84** (2005)]

1. Paramétrisation de Feynman
2. Représentation de Mellin-Barnes
3. Théorème de « Converse-Mapping »

[Ph. Flajolet, X. Gourdon et Ph. Dumas '95]

Transformée de Mellin

$$\mathcal{M}[f](s) \doteq \int_0^{\infty} dx x^{s-1} f(x)$$

Si f est intégrable et que: $f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{=} \mathcal{O}(x^{-\alpha})$ et $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(x^{-\beta})$

Alors $\mathcal{M}[f]$ est analytique dans $\alpha < \operatorname{Re} s < \beta$ (**bande fondamentale**)

$$\forall c \in \langle \alpha, \beta \rangle, \quad f(x) = \frac{1}{2i\pi} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds x^{-s} \mathcal{M}[f](s)$$

□ Exemples

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^\nu} \quad \mathcal{M}[f](s) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(\nu-s)}{\Gamma(\nu)} \quad \langle 0, \operatorname{Re} \nu \rangle$$

$$f(x) = \ln(1+x) \quad \mathcal{M}[f](s) = \frac{\pi}{s \sin(\pi s)} \quad \langle -1, 0 \rangle$$

Théorème de Converse Mapping •◦

Ce théorème permet de relier les singularités de la transformée de Mellin au développement asymptotique de la fonction

❑ Élément singulier

Série de Laurent de f en p :

$$f(s) \underset{s \rightarrow p}{=} \cdots + A_{-2} \frac{1}{(s-p)^2} + A_{-1} \frac{1}{s-p} + A_0 + A_1(s-p) + \cdots$$

❑ Développement singulier

Série formelle de tous les éléments singuliers sur l'ensemble des pôles.

❑ Exemple

$$\Gamma(s) \asymp \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{s+n} .$$

Théorème de Converse Mapping ◦•

[Doetsch '55] [Flajolet *et al.* '95]

Développement singulier

$$\mathcal{M}[f(x)]_{\text{right}}(s) \asymp \sum_{p > \beta} \sum_n^{N(p)} c_{p,n} \frac{1}{(s - p)^n}$$

$$\mathcal{M}[f(x)]_{\text{left}}(s) \asymp \sum_{p < \alpha} \sum_n^{N(p)} d_{p,n} \frac{1}{(s + p)^n}$$

Le théorème donne

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} - \sum_{p > \beta} \sum_n^{N(p)} c_{p,n} x^{-p} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \ln^{n-1} x$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{p < \alpha} \sum_n^{N(p)} d_{p,n} x^p \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \ln^{n-1} x$$

Exemple de calcul à deux boucles

$$\begin{aligned}
 a_\mu &= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \int_0^1 \frac{dx}{x} (1-x) \Pi_R^{(\ell)} \left(-\frac{x^2}{1-x} m_\mu^2 \right) \\
 &= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \int_0^1 \frac{dx}{x} (1-x)(2-x) \int_0^1 dy \frac{y(1-y)}{1 + \frac{m_\ell^2}{m_\mu^2} \frac{1-x}{x^2 y(1-y)}}
 \end{aligned}$$

Lautrup - de Rafael '69

On utilise alors la représentation :

$$\frac{1}{1+X} = \frac{1}{2i\pi} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds X^{-s} \frac{\pi}{\sin \pi s} \quad \text{pour } 0 < c < 1$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow a_\mu &= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \frac{1}{2i\pi} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \left(\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2}\right)^{-s} \frac{\pi}{\sin \pi s} \int_0^1 dx x^{2s-1} (1-x)^{1-s} (2-x) \int_0^1 dy y^{1+s} (1-y)^{1+s} \\
 &= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \frac{1}{2i\pi} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \left(\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2}\right)^{-s} \frac{(1-s)}{(2+s)(1+2s)(3+2s)} \left(\frac{\pi}{\sin \pi s}\right)^2
 \end{aligned}$$

$$0 < c < 1$$

$$a_\mu = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \frac{1}{2i\pi} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \left(\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2}\right)^{-s} \frac{(1-s)}{(2+s)(1+2s)(3+2s)} \left(\frac{\pi}{\sin \pi s}\right)^2$$

$$0 < c < 1$$

- $\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2} \gg 1$: Développement singulier à droite de la bande fondamentale

$$\frac{(1-s)}{(2+s)(1+2s)(3+2s)} \left(\frac{\pi}{\sin \pi s}\right)^2 \asymp \left(-\frac{1}{45}\right) \frac{1}{s-1} + \left(-\frac{1}{140}\right) \frac{1}{(s-2)^2} + \left(-\frac{9}{19600}\right) \frac{1}{s-2} + \dots$$

$$a_\mu = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \left[\frac{1}{45} \frac{m_\mu^2}{m_\ell^2} + \frac{1}{140} \left(\frac{m_\mu^2}{m_\ell^2}\right)^2 \ln\left(\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2}\right) + \frac{9}{19600} \left(\frac{m_\mu^2}{m_\ell^2}\right)^2 + \dots \right]$$

- $\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2} \ll 1$: Développement singulier à gauche de la bande fondamentale

$$\frac{(1-s)}{(2+s)(1+2s)(3+2s)} \left(\frac{\pi}{\sin \pi s}\right)^2 \asymp \left(\frac{1}{6}\right) \frac{1}{s^2} + \left(-\frac{25}{36}\right) \frac{1}{s} + \left(\frac{\pi^2}{4}\right) \frac{1}{s-\frac{1}{2}} + \dots$$

$$a_\mu = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \left[\frac{1}{6} \ln\left(\frac{m_\mu^2}{m_\ell^2}\right) - \frac{25}{36} + \frac{\pi^2}{4} \left(\frac{m_\ell}{m_\mu}\right) + \dots \right]$$

On vérifie ainsi très facilement les calculs de [Li et al. '93]

$$a_\mu = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \frac{1}{2i\pi} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \left(\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2}\right)^{-s} \frac{(1-s)}{(2+s)(1+2s)(3+2s)} \left(\frac{\pi}{\sin \pi s}\right)^2$$

$$0 < c < 1$$

- $\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2} \gg 1$: Développement singulier à droite de la bande fondamentale

$$\frac{(1-s)}{(2+s)(1+2s)(3+2s)} \left(\frac{\pi}{\sin \pi s}\right)^2 \asymp \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{s-(n+1)} \frac{-45+28n^2+8n^3}{[(3+n)(3+2n)(5+2n)]^2} + \frac{1}{[s-(n+1)]^2} \frac{(-n)}{(3+n)(3+2n)(5+2n)} \right]$$

$$a_\mu^{\text{v.p.}} \underset{m_\ell \gg m_\mu}{\sim} \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{m_\mu^2}{m_\ell^2}\right)^{n+1} \left[\frac{45-28n^2-8n^3}{[(3+n)(3+2n)(5+2n)]^2} + \frac{n}{(3+n)(3+2n)(5+2n)} \ln \frac{m_\ell^2}{m_\mu^2} \right]$$

- $\frac{m_\ell^2}{m_\mu^2} \ll 1$: Développement singulier à gauche de la bande fondamentale

$$\frac{(1-s)}{(2+s)(1+2s)(3+2s)} \left(\frac{\pi}{\sin \pi s}\right)^2 \asymp \left(\frac{1}{6}\right) \frac{1}{s^2} + \left(-\frac{25}{36}\right) \frac{1}{s} + \left(\frac{\pi^2}{4}\right) \frac{1}{s-\frac{1}{2}} + \dots$$

$$a_\mu = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \left[\frac{1}{6} \ln \left(\frac{m_\mu^2}{m_\ell^2}\right) - \frac{25}{36} + \frac{\pi^2}{4} \left(\frac{m_\ell}{m_\mu}\right) + \dots \right]$$

On vérifie ainsi très facilement les calculs de [Li et al. '93]

Exemple de calcul à trois boucles

$$a_{\mu}^{\text{v.p.}}(e, \tau) = \frac{\alpha}{\pi} \int_0^1 dx (1-x) 2 \left[-e^2 \Pi_{\text{R}}^{(e)} \left(\frac{-x^2}{1-x} m_{\mu}^2 \right) \right] \left[-e^2 \Pi_{\text{R}}^{(\tau)} \left(\frac{-x^2}{1-x} m_{\mu}^2 \right) \right]$$

$$(-ie)^2 \Pi_{\text{R}}^{(l)} \left(\frac{-x^2}{1-x} m_{\mu}^2 \right) = -\frac{\alpha}{\pi} \int_0^1 dz_l 2z_l (1-z_l) \ln \left(1 + \frac{x^2}{1-x} \frac{m_{\mu}^2}{m_l^2} z_l (1-z_l) \right)$$

On utilise la représentation:

$$\ln \left(1 + \frac{m_{\mu}^2}{m_l^2} X_l \right) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \left(\frac{m_{\mu}^2}{m_l^2} \right)^{-s} [X_l]^{-s} \frac{\pi}{s \sin(\pi s)}$$

$$c = \text{Re}(s) \in]-1, 0[$$

Représentation de Mellin-Barnes:

$$\mathcal{M}[a_{\mu}^{\text{v.p.}}](s, t) = 8 \frac{\Gamma(s)\Gamma(1-s)}{s} \frac{\Gamma(t)\Gamma(1-t)}{t} \frac{[\Gamma(2-s)\Gamma(2-t)]^2}{\Gamma(4-2s)\Gamma(4-2t)} \frac{\Gamma(1-2s-2t)\Gamma(2+s+t)}{\Gamma(3-s-t)}$$

Nous appliquons le théorème de Converse Mapping de façon « séquentielle »:

$$a_{\mu}^{\text{2v.p.}} \left(\frac{m_e^2}{m_{\mu}^2}, \frac{m_{\tau}^2}{m_{\mu}^2} \right) \underset{\frac{m_{\mu}^2}{m_{\tau}^2} \rightarrow 0}{\sim} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^3 \frac{1}{2i\pi} \int_{c_s - i\infty}^{c_s + i\infty} ds \left[\left(\frac{m_{\mu}^2}{m_e^2} \right)^{-s} \sum_{n \geq 1} A_n(s) \left(\frac{m_{\mu}^2}{m_{\tau}^2} \right)^n + \left(\frac{m_{\tau}^2}{m_e^2} \right)^{-s} \sum_{n \geq 0} B_n(s) \left(\frac{m_{\mu}^2}{m_{\tau}^2} \right)^{n+2} \right].$$

avec:

$$\begin{pmatrix} A_n(s) \\ B_n(s) \end{pmatrix} \doteq 8 \frac{\Gamma(s)\Gamma(1-s)\Gamma^2(2-s)}{s\Gamma(4-2s)} \begin{pmatrix} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{\Gamma(2+n)\Gamma(2+n)}{\Gamma(4+2n)} \frac{\Gamma(1-2s+2n)\Gamma(2+s-n)}{\Gamma(3-s+n)} \\ \frac{(-1)^{n+1}}{n!} \frac{\Gamma(-2-n-s)\Gamma(3+n+s)\Gamma(4+n+s)\Gamma(4+n+s)\Gamma(5+2n)}{(s+n+2)\Gamma(8+2n+2s)\Gamma(5+n)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
a_{\mu}^{\text{v.p.}} = & \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^3 \left\{ -\frac{4\pi^2}{45} \frac{m_{\mu}^2}{m_{\tau}^2} \left(\frac{m_{\mu}^2}{m_e^2}\right)^{-\frac{3}{2}} \right. \\
& + \sum_{n \geq 1} \sum_{k \geq 0} \frac{2^{2n} \Gamma^2(2+n)}{n \Gamma(4+2n)} \left(\frac{m_{\mu}^2}{m_{\tau}^2}\right)^n \left(\frac{m_{\mu}^2}{m_e^2}\right)^{-k} \left[-\frac{1}{2} A_{n,k}^{(3)} \ln^2\left(\frac{m_{\mu}^2}{m_e^2}\right) + A_{n,k}^{(2)} \ln\left(\frac{m_{\mu}^2}{m_e^2}\right) - A_{n,k}^{(1)} \right] \\
& \left. - \sum_{n \geq 0} \sum_{k \geq 0} \frac{\Gamma(5+2n)}{n! \Gamma(5+n)} \left(\frac{m_{\mu}^2}{m_{\tau}^2}\right)^{n+2} \left(\frac{m_{\tau}^2}{m_e^2}\right)^{-k} \left[-\frac{1}{2} B_{n,k}^{(3)} \ln^2\left(\frac{m_{\tau}^2}{m_e^2}\right) + B_{n,k}^{(2)} \ln\left(\frac{m_{\tau}^2}{m_e^2}\right) - B_{n,k}^{(1)} \right] \right\}
\end{aligned}$$

$$A_{n,1}^{(3)} = 0$$

$$A_{n,1}^{(2)} = \frac{2\Gamma(n-\frac{1}{2})}{\sqrt{\pi} \Gamma(2+n)} (n-2)(n-1)$$

$$A_{n,1}^{(1)} = A_{n,1}^{(2)} \left[\frac{3-2n}{(n-2)(n-1)} + \psi\left(\frac{3}{2}\right) - \psi\left(n-\frac{1}{2}\right) + \psi(2+n) - \psi(2) \right]$$

$$A_{n,n-1}^{(3)} = 0$$

$$A_{n,n-1}^{(2)} = (-1)^n \frac{\sqrt{\pi}(2-n)}{12 \Gamma(n) \Gamma(\frac{7}{2}-n)}$$

$$A_{n,n-1}^{(1)} = A_{n,n-1}^{(2)} \left[\frac{n-3}{2-n} + \psi\left(\frac{7}{2}-n\right) - \psi\left(\frac{3}{2}\right) + \psi(4) - \psi(n) \right]$$

$$A_{n,n}^{(3)} = 0$$

$$A_{n,n}^{(2)} = -(-1)^n \frac{\sqrt{\pi}(n-1)}{2(n!) \Gamma\left(\frac{5}{2} - n\right)}$$

$$A_{n,n}^{(1)} = A_{n,n}^{(2)} \left[\frac{n}{n-1} + \psi\left(\frac{5}{2} - n\right) - \psi\left(\frac{1}{2}\right) + \psi(3) - \psi(n+1) \right]$$

$$A_{n,k}^{(3)} = (-1)^k \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} + n - k\right)}{\Gamma(k+1)\Gamma\left(\frac{5}{2} - k\right)\Gamma(3 - k + n)} (n-1-k)(n-k)(1-k)$$

$$A_{n,k}^{(2)} = A_{n,k}^{(3)} \left[\frac{1-n-n^2+4nk-3k^2}{(n-1-k)(n-k)(1-k)} + \psi\left(\frac{5}{2} - k\right) - \psi\left(\frac{1}{2} + n - k\right) + \psi(3+n-k) - \psi(k+1) \right]$$

$$A_{n,k}^{(1)} = \frac{1}{2} A_{n,k}^{(3)} \left\{ \pi^2 + \left[\frac{1-n-n^2+4nk-3k^2}{(n-1-k)(n-k)(1-k)} + \psi\left(\frac{5}{2} - k\right) - \psi\left(\frac{1}{2} + n - k\right) + \psi(3+n-k) - \psi(k+1) \right]^2 \right. \\ \left. - \frac{1}{(k-n)^2} - \frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{(k-n+1)^2} - \psi'\left(\frac{5}{2} - k\right) + \psi'\left(\frac{1}{2} + n - k\right) - \psi'(3+n-k) - \psi'(1+k) \right\}$$

$$B_{n,1}^{(3)} = 0$$

$$B_{n,1}^{(2)} = \frac{8\Gamma^2(5+n)}{(n+3)\Gamma(10+2n)}$$

$$B_{n,1}^{(1)} = B_{n,1}^{(2)} \left[-\frac{21+5n}{6(n+3)} + \ln 4 + \psi\left(\frac{3}{2}\right) - 2\psi(2) + \psi(4) + 2\psi(5+n) - 2\psi(10+2n) \right]$$

$$\begin{aligned}
B_{n,k}^{(3)} &= \sqrt{\pi} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \frac{4^k \Gamma(3+k) \Gamma^2(4+n+k) (k-1)}{(k+2)(k+1)(k+n+2) \Gamma\left(\frac{5}{2}-k\right) \Gamma(8+2n+2k)} \\
B_{n,k}^{(2)} &= B_{n,k}^{(3)} \left[\frac{12+5n+2(5+n)k - (2+n)k^2 - 2k^3}{(k-1)(1+k)(2+k)(2+n+k)} \right. \\
&\quad \left. + \ln 4 + \psi\left(\frac{5}{2}-k\right) - 2\psi(1+k) + \psi(3+k) + 2\psi(4+n+k) - 2\psi(8+2n+2k) \right] \\
B_{n,k}^{(1)} &= \frac{1}{2} B_{n,k}^{(3)} \left\{ 9\psi^2(k+1) + \pi^2 + 3\psi'(k+1) \right. \\
&\quad - 6\psi(k+1) \left[\frac{12+5n+2(5+n)k - (2+n)k^2 - 2k^3}{(k-1)(1+k)(2+k)(2+n+k)} \right. \\
&\quad \left. + \ln 4 + \psi\left(\frac{5}{2}-k\right) + \psi(1+k) + \psi(3+k) + 2\psi(4+n+k) - 2\psi(8+2n+2k) \right] \\
&\quad + \left[\frac{12+5n+2(5+n)k - (2+n)k^2 - 2k^3}{(k-1)(1+k)(2+k)(2+n+k)} \right. \\
&\quad \left. + \ln 4 + \psi\left(\frac{5}{2}-k\right) + \psi(1+k) + \psi(3+k) + 2\psi(4+n+k) - 2\psi(8+2n+2k) \right]^2 \\
&\quad - \frac{1}{(k-1)^2} + \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{1}{(k+2)^2} + \frac{1}{(k+n+2)^2} \\
&\quad \left. - \psi'\left(\frac{5}{2}-k\right) + \psi'(1+k) + \psi'(3+k) + 2\psi'(4+n+k) - 4\psi'(8+2n+2k) \right\}
\end{aligned}$$

Premier résultat complet de ce calcul à 3 boucles (après les premiers termes obtenus en 1999).

Cette formule clôt 30 ans de calculs nécessaires à l'obtention de la contribution « analytique » à trois boucles de l'anomalie (~70 diagrammes!)....

Exemple: Insertion de polarisations hadroniques (sous-dominantes)

[S.Friot, D.Greynat et E.de Rafael, *Travail en cours de réalisation*]

[Krause '96]

Relations de dispersion (séparation perturbatif—non perturbatif)

$$a_{\mu}^{2\text{pol.}} = \frac{\alpha}{\pi} \int_{4m^2}^{\infty} \frac{ds}{s} \int_{4m^2}^{\infty} \frac{dt}{t} \frac{1}{\pi^2} \text{Im}\Pi_1(s) \text{Im}\Pi_2(t) \int_0^1 dx \frac{x^4(1-x)}{\left[x^2 + (1-x)\frac{t}{m_{\mu}^2} \right] \left[x^2 + (1-x)\frac{s}{m_{\mu}^2} \right]}$$

Cas d'une pol. électromagnétique et d'une pol. Hadronique:

$$\int_{4m_{\ell}^2}^{\infty} \frac{ds}{s} \frac{1}{x^2 + (1-x)\frac{s}{m_{\mu}^2}} \frac{1}{\pi} \text{Im}\Pi_E(s) = -\frac{1}{x^2} \Pi_E \left(-\frac{x^2}{1-x} m_{\mu}^2 \right)$$

$$\frac{1}{1+X} = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds X^{-s} \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \quad c = \text{Re}(s) \in]0, 1[$$

$$\ln(1+X) = \frac{1}{2\pi i} \int_{d-i\infty}^{d+i\infty} du X^{-u} \frac{\pi}{u \sin(\pi u)} \quad d = \text{Re}(u) \in]-1, 0[$$

On obtient

$$\begin{aligned}
 a_{\mu}^{2\text{pol.E-H}} = & \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 \int_{4m_{\pi}^2}^{\infty} \frac{dt}{t} \frac{1}{\pi} \text{Im}\Pi_H(t) \frac{1}{2i\pi} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \left(\frac{t}{m_{\mu}^2}\right)^{-s} \frac{1}{2i\pi} \int_{d-i\infty}^{d+i\infty} du \left(\frac{m_{\mu}^2}{m_{\ell}^2}\right)^{-u} \\
 & \times \underbrace{\frac{\pi}{\sin(\pi s)} \frac{\Gamma(2s-2u+1)\Gamma(2-s+u)}{\Gamma(3+s-u)} 2 \frac{\pi}{u \sin(\pi u)} \frac{\Gamma(2-u)^2}{\Gamma(4-2u)}}_{\frac{1}{2} \mathcal{M} [K^{(2b)}] (u, s)}
 \end{aligned}$$

Cas de l'électron dans la pol. élect.

$$\mathcal{M} [K^{(2b)}] (u, s) \underset{u \rightarrow 0, s \rightarrow 1}{\sim} 4 \frac{1}{u^2} \frac{1}{s-1} (-1)^0 (-1) \frac{\Gamma(3)\Gamma(1)}{\Gamma(4)} \frac{\Gamma(2)^2}{\Gamma(4)} = -\frac{1}{u^2} \frac{1}{s-1} \frac{2}{9}$$

Donc, par le théorème de Converse Mapping,

$$K^{(2b)} \Big|_{\text{électron}} (t) \underset{\frac{t}{m_{\mu}^2} \rightarrow \infty, \frac{m_{\mu}^2}{m_e^2} \rightarrow \infty}{\sim} \frac{2}{9} \frac{m_{\mu}^2}{t} \ln \frac{m_{\mu}^2}{m_e^2}$$

On obtient facilement les termes suivants du développement, ce qui permet de vérifier et d'étendre les calculs de [\[Krause '96\]](#):

$$\begin{aligned}
K^{(2b)} \Big|_{\text{électron}} \Big|_{\frac{t}{m_\mu^2} \rightarrow \infty, \frac{m_\mu^2}{m_e^2} \rightarrow \infty} &\sim 2 \frac{m_\mu^2}{t} \left\{ \left(-\frac{2}{18} + \frac{1}{9} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} \right) \right. \\
&+ \frac{m_\mu^2}{t} \left(-\frac{55}{48} + \frac{\pi^2}{18} + \frac{25}{36} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} + \frac{5}{9} \ln \frac{t}{m_\mu^2} - \frac{1}{3} \ln \frac{t}{m_\mu^2} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} - \frac{1}{6} \ln^2 \frac{t}{m_\mu^2} \right) \\
&+ \frac{m_\mu^4}{t^2} \left(-\frac{11299}{1800} + \frac{\pi^2}{3} + \frac{97}{30} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} + \frac{10}{3} \ln \frac{t}{m_\mu^2} - 2 \ln \frac{t}{m_\mu^2} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} - \ln^2 \frac{t}{m_\mu^2} \right) \\
&+ \frac{m_\mu^6}{t^3} \left(-\frac{6419}{225} + \frac{14}{9} \pi^2 + \frac{208}{15} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} + \frac{140}{9} \ln \frac{t}{m_\mu^2} - \frac{28}{3} \ln \frac{t}{m_\mu^2} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} - \frac{14}{3} \ln^2 \frac{t}{m_\mu^2} \right) \\
&+ \left. \frac{m_\mu^8}{t^4} \left(-\frac{53350}{441} + \frac{20}{3} \pi^2 + \frac{3608}{63} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} + \frac{200}{3} \ln \frac{t}{m_\mu^2} - 40 \ln \frac{t}{m_\mu^2} \ln \frac{m_\mu^2}{m_e^2} - 20 \ln^2 \frac{t}{m_\mu^2} \right) \right\} \\
&+ 2 \frac{m_e^2}{m_\mu^2} \left\{ \frac{m_\mu^2}{t} - \frac{2 m_\mu^4}{3 t^2} + \frac{m_\mu^6}{t^3} \left(2 \ln \frac{t}{m_\mu^2} - \frac{25}{6} \right) + \frac{m_\mu^8}{t^4} \left(12 \ln \frac{t}{m_\mu^2} - \frac{97}{5} \right) + \frac{m_\mu^{10}}{t^5} \left(56 \ln \frac{s}{m_\mu^2} - \frac{416}{5} \right) \right\}
\end{aligned}$$

Cas du tau dans la pol. élect. (non calculé jusqu'à présent)

$$K^{(2b)} \Big|_{\text{tau}}(t) \underset{\frac{t}{m_\mu^2} \rightarrow \infty, \frac{m_\mu^2}{m_\tau^2} \rightarrow 0}{\sim} 2 \frac{m_\mu^2}{m_\tau^2} \left\{ \frac{1}{15} \frac{m_\mu^4}{t^2} \ln \frac{t}{m_\mu^2} - \frac{5}{36} \frac{m_\mu^2}{t} \right\}$$

Double polarisation hadronique

$$\frac{1}{1+X} = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds X^{-s} \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \quad c = \text{Re}(s) \in]0, 1[$$

On obtient

$$\begin{aligned} a_\mu^{2\text{pol.H}} = & \frac{\alpha}{\pi} \int_{4m^2}^{\infty} \frac{ds}{s} \int_{4m^2}^{\infty} \frac{dt}{t} \frac{1}{\pi^2} \text{Im}\Pi_1(s) \text{Im}\Pi_2(t) \left(\frac{1}{2i\pi} \right)^2 \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} du \int_{d-i\infty}^{d+i\infty} dv \left(\frac{t}{m_\mu^2} \right)^{-u} \left(\frac{s}{m_\mu^2} \right)^{-v} \\ & \times \frac{\pi}{\sin(\pi u)} \frac{\pi}{\sin(\pi v)} \frac{\Gamma(2u+2v+1)\Gamma(2-u-v)}{\Gamma(3+u+v)} \end{aligned}$$

Les calculs s'effectuent ensuite de façon similaire au cas H-E

Seconde partie

Sommes harmoniques et fonctions à deux points en Large N_c QCD

E.de Rafael, *Travail en cours*

La fonction d'Adler

(Fonction à deux points particulière)

Fonction à deux points vectorielle: $\Pi_V(q^2) = x \text{---} y$

On définit la fonction d'Adler comme:

(relation de dispersion)
$$\mathcal{A}(Q^2) = \int_0^\infty dt \frac{Q^2}{(t+Q^2)^2} \frac{1}{\pi} \text{Im}\Pi_V(t) \quad (Q^2 \equiv -q^2 \geq 0)$$

Spectre contenant l'information physique

En Large N_C QCD le spectre est:
$$\frac{1}{\pi} \text{Im}\Pi_V(t) = \sum_{n=1}^\infty \gamma_n M_n^2 \delta(t - M_n^2)$$

En posant $z = \frac{Q^2}{M_1^2}$ et $\mu_n = \frac{M_n^2}{M_1^2}$, $M^2 \equiv M_1^2$ nous obtenons

$$\mathcal{A}(Q^2) = \sum_{n=1}^\infty \gamma_n \frac{\mu_n z}{(1 + \mu_n z)^2} \equiv \text{Somme harmonique}$$

Two-Point Functions (in Large- N_c QCD) are Harmonic Sums

$$\mathcal{A}(Q^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \gamma_n \frac{\mu_n z}{(1 + \mu_n z)^2} \quad \text{where} \quad z = \frac{Q^2}{M_1^2} \quad \text{and} \quad \mu_n = \frac{M^2}{M_n^2}, \quad M^2 \equiv M_1^2$$

$$\mathcal{A}(z) = \gamma \sum_n \lambda_n g_{\text{Adler}}(\mu_n z) \quad \lambda_n = \frac{\gamma_n}{\gamma_1}, \quad \gamma = \gamma_1 = \frac{3}{2\pi\alpha^2} \frac{1}{M_\rho} \Gamma_{\rho \rightarrow e^+e^-}$$

Harmonic Sums are defined by a **Base Function** and a **Dirichlet Series**

Base Function: $g_{\text{Adler}}(z) = \frac{z}{(1+z)^2}$

Dirichlet Series: $\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \mu_n^{-s}$

(**Riemann zeta-function:** $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$)

How does the Dirichlet Series appear ??

Harmonic Sums have a factorizable Mellin-Transform

$$\mathcal{A}(z) = \gamma \sum_n \lambda_n g_{\text{Adler}}(\mu_n z) \quad \lambda_n = \frac{\gamma_n}{\gamma_1}, \quad \gamma = \gamma_1 = \frac{3}{2\pi\alpha^2} \frac{1}{M_\rho} \Gamma_{\rho \rightarrow e^+ e^-}$$

Base Function: $g_{\text{Adler}}(z) = \frac{z}{(1+z)^2}$

Dirichlet Series: $\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \mu_n^{-s}$

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}(z)](s) = \gamma \mathcal{M}[g_{\text{Adler}}(z)](s) \Lambda(s)$$

$$\mathcal{A}(z) = \frac{\gamma}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds z^{-s} \Lambda(s) \Gamma(1+s) \Gamma(1-s)$$

- ★ Comment on the factorization of the $z = Q^2/M^2$ dependence
- ★ Comment on the fundamental strip (Recall that $\mu_n = \frac{M^2}{M_n^2}$)

Phenomenological Example

$$a_{\mu}^{\text{H}} = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx \frac{1}{x} (1-x)(2-x) e^2 \frac{2}{3} \mathcal{A} \left(\frac{x^2}{1-x} m_{\mu}^2 \right)$$

In Large- N_c QCD:

$$a_{\mu}^{\text{H}} = \frac{4}{3} \alpha^2 \frac{\gamma}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \left(\frac{m_{\mu}^2}{M^2} \right)^{-s} \Lambda(s) \left\{ \frac{\Gamma(-2s)\Gamma(1+s)}{1-s} \left[\Gamma(2+s) + \frac{\Gamma(3+s)}{2-s} \right] \right\}$$

$$\asymp \frac{2}{3} \frac{1}{1+s} - 2 \frac{1}{(s+2)^2} + \frac{25}{6} \frac{1}{s+2} + \dots$$

$$a_{\mu}^{\text{H}} = \frac{4}{3} \alpha^2 \gamma \left\{ \Lambda(-1) \frac{2}{3} \frac{m_{\mu}^2}{M^2} + \Lambda(-2) \left(\frac{m_{\mu}^2}{M^2} \right)^2 \left[2 \log \frac{m_{\mu}^2}{M^2} + \frac{25}{6} \right] + \dots \right\}$$

In a model where

$$\frac{1}{\pi} \text{Im} \Pi_V(t) = A \sigma^2 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - M_0^2 - n\sigma^2) \quad (\text{Golterman, Peris, Phily, de Rafael '02})$$

$$\Lambda(s) = \sum_{n=0}^{\infty} (1+2n)^{s-1} = [1 - 2^{s-1}] \zeta(1-s)$$

$$\Lambda(-1) = \frac{3}{4} \zeta(2) = 1.233\dots, \quad \Lambda(-2) = \frac{7}{8} \zeta(3) = 1.058\dots$$

The Left-Right Correlation Function

$$\int d^4x e^{iq \cdot x} \langle 0 | T \{ \bar{u}_L \gamma^\mu d_L(x) \bar{d}_R \gamma^\nu u_R(0) \} | 0 \rangle = \frac{1}{2i} (q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu}) \underline{\Pi_{LR}(Q^2)}$$

Taylor Expansion of Green's Function

$$-Q^2 \underline{\Pi_{LR}(Q^2)}|_{Q^2 \rightarrow 0} = F_0^2 + 4L_{10} Q^2 + \mathcal{O}(Q^4)$$

Integral of Green's Function

$$C = \frac{3}{32\pi^2} \int_0^\infty dQ^2 \left(-Q^2 \underline{\Pi_{LR}(Q^2)} \right)$$

$\Pi_{LR}(Q^2)$ in Large N_c QCD

$$\Pi_{LR}(Q^2) = \sum_V \frac{f_V^2 M_V^2}{Q^2 + M_V^2} - \sum_A \frac{f_A^2 M_A^2}{Q^2 + M_A^2} - \frac{F_0^2}{Q^2}$$

No $1/Q^2$ term in OPE $\rightarrow \sum_V f_V^2 M_V^2 - \sum_A f_A^2 M_A^2 - F_0^2 = 0$
1st Weinberg Sum Rule

No $1/Q^4$ term in OPE $\rightarrow \sum_V f_V^2 M_V^4 - \sum_A f_A^2 M_A^4 = 0$
2nd Weinberg Sum Rule

In Large- N_c QCD there are an infinite number of sum rules which relate **Hadronic Masses** and **Couplings** to **Local Order Parameters** of the OPE and to **Non-Local Order Parameters** of the Chiral Lagrangian (*Knecht—de Rafael '98*)

Matching $1/Q^6$ term to OPE $\rightarrow \sum_V f_V^2 M_V^6 - \sum_A f_A^2 M_A^6 = [-4\pi\alpha_s + \mathcal{O}(\alpha_s^2)] \langle \bar{\psi}\psi \rangle^2$

Matching to $O(p^4)$ in ChPT $\rightarrow \sum_V f_V^2 - \sum_A f_A^2 = -4L_{10}$

$$\Pi_{LR}(Q^2) = \sum_V \frac{f_V^2 M_V^2}{Q^2 + M_V^2} - \sum_A \frac{f_A^2 M_A^2}{Q^2 + M_A^2} - \frac{F_0^2}{Q^2}$$

★ One can use Mellin-Barnes for each Sum (**infinite number of states**)

$$\gamma \sum_n \frac{\lambda_n}{1 + \mu_n z} = \frac{\gamma}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \Lambda(s) z^{-s} \Gamma(s) \Gamma(1-s) \quad \text{with} \quad \Lambda(s) = \sum_n \lambda_n \mu_n^{-s}$$

and define properly the matching to the **chiral expansion** (z-small) and the **OPE** (z-large)

★ Models of Large-Nc (**MHA**): $-\frac{Q^2}{F_0^2} \Pi_{LR}(Q^2) = \frac{1}{g_A} \frac{1}{(z+1) \left(z + \frac{1}{g_A}\right)}, \quad g_A = \frac{M_V^2}{M_A^2}$

and compare them to generalizations with an **infinite number of states**, example:

$$\frac{1}{\pi} \text{Im} \Pi_{LR}(t) = -F_0^2 \delta(t) + 2F_V^2 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - M_V^2 - n\sigma^2) - 2F_A^2 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - M_A^2 - n\sigma^2)$$

$$-\frac{Q^2}{F_0^2} \Pi_{LR}(Q^2) = 1 + \frac{g_A}{1-g_A} z \left[\psi \left(\frac{z+1}{1+\frac{1}{g_A}} \right) - \psi \left(\frac{z+\frac{1}{g_A}}{1+\frac{1}{g_A}} \right) \right]$$

$$\frac{1}{g_A} \frac{1}{(z+1) \left(z + \frac{1}{g_A}\right)}$$

versus

$$1 + \frac{g_A}{1-g_A} z \left[\psi \left(\frac{z+1}{1 + \frac{1}{g_A}} \right) - \psi \left(\frac{z + \frac{1}{g_A}}{1 + \frac{1}{g_A}} \right) \right]$$

CONCLUSIONS

- ✦ **Harmonic Sums** are the natural framework for **Large-Nc QCD**
- ✦ **Region *absolute convergence Dirichlet series*** $\longleftrightarrow$ ***ChPT-region***
- ✦ ***OPE*** defined by ***Analytic Continuation*** of the ***Dirichlet series***
- ✦ **QUESTION ???**

QCD Generalized Two-Point Function $\longleftrightarrow$ Type of Dirichlet series